

Steiermark: Gestorbene nach Todesursachen seit 1970										
	Insgesamt	Todesursachen-Hauptgruppen								
		Bösartige Neubildungen	Krankheiten des Herz-Kreislaufsystems	Krankheiten der Atmungsorgane	Krankheiten der Verdauungsorgane	Sonstige Krankheiten	Verletzungen und Vergiftungen			
in Prozent										
1970	100,0%	17,7%	45,2%	9,9%	5,9%	12,5%	8,8%			
1971	100,0%	18,5%	46,9%	6,4%	6,1%	12,3%	9,8%			
1972	100,0%	18,7%	49,1%	4,5%	5,8%	11,9%	10,0%			
1973	100,0%	19,5%	47,0%	6,4%	6,1%	11,4%	9,5%			
1974	100,0%	19,2%	49,2%	5,2%	5,8%	11,1%	9,4%			
1975	100,0%	18,4%	48,8%	6,6%	6,2%	11,3%	8,8%			
1976	100,0%	18,4%	50,1%	6,3%	6,0%	11,0%	8,2%			
1977	100,0%	19,7%	49,6%	4,8%	6,5%	11,0%	8,5%			
1978	100,0%	19,0%	50,3%	5,9%	5,9%	10,3%	8,6%			
1979	100,0%	19,9%	49,3%	4,9%	6,1%	11,6%	8,2%			
1980	100,0%	20,6%	52,4%	4,5%	5,5%	9,0%	8,1%			
1981	100,0%	19,6%	52,3%	4,7%	5,8%	9,5%	8,0%			
1982	100,0%	20,6%	51,9%	4,2%	5,7%	9,3%	8,3%			
1983	100,0%	19,4%	51,7%	5,3%	6,0%	8,6%	8,9%			
1984	100,0%	21,5%	51,2%	4,5%	6,2%	8,6%	8,1%			
1985	100,0%	20,3%	51,3%	5,4%	5,7%	9,0%	8,2%			
1986	100,0%	20,4%	52,3%	4,5%	5,7%	9,2%	7,9%			
1987	100,0%	22,0%	51,7%	4,5%	5,4%	8,9%	7,5%			
1988	100,0%	22,0%	51,6%	4,3%	5,3%	9,1%	7,8%			
1989	100,0%	22,3%	50,8%	4,8%	5,6%	9,2%	7,3%			
1990	100,0%	23,0%	49,9%	4,6%	5,4%	9,8%	7,3%			
1991	100,0%	22,9%	51,8%	4,5%	5,2%	9,1%	6,5%			
1992	100,0%	23,5%	50,9%	4,3%	5,6%	9,2%	6,7%			
1993	100,0%	23,9%	51,2%	4,7%	5,7%	8,4%	6,1%			
1994	100,0%	24,5%	51,6%	3,7%	5,5%	8,1%	6,6%			
1995	100,0%	24,0%	52,4%	4,2%	4,9%	8,1%	6,4%			
1996	100,0%	24,2%	53,0%	3,9%	5,1%	7,7%	6,1%			
1997	100,0%	24,1%	53,8%	3,8%	4,5%	7,8%	6,0%			
1998	100,0%	23,8%	54,3%	4,1%	4,3%	7,6%	5,8%			
1999	100,0%	24,2%	54,6%	4,6%	3,8%	7,2%	5,6%			
2000	100,0%	25,7%	52,5%	4,3%	4,6%	7,3%	5,6%			
2001	100,0%	24,9%	50,9%	4,8%	4,8%	9,4%	5,3%			
2002	100,0%	25,6%	47,2%	4,9%	4,7%	11,5%	6,0%			
2003	100,0%	25,3%	44,3%	5,9%	5,2%	13,3%	6,0%			
2004	100,0%	25,2%	44,7%	5,3%	4,3%	14,9%	5,5%			
2005	100,0%	24,8%	43,1%	5,7%	4,6%	15,7%	6,1%			
2006	100,0%	25,2%	43,8%	5,4%	4,2%	15,5%	5,9%			
2007	100,0%	25,4%	44,3%	5,8%	4,2%	14,7%	5,6%			
2008	100,0%	25,5%	43,8%	5,1%	4,0%	15,8%	5,7%			
2009	100,0%	24,8%	44,5%	4,6%	4,0%	16,5%	5,5%			
2010	100,0%	25,5%	43,9%	5,1%	4,2%	16,3%	5,0%			
2011	100,0%	25,7%	42,8%	4,8%	4,2%	17,1%	5,5%			
2012	100,0%	25,8%	43,3%	4,6%	3,5%	17,4%	5,3%			
2013	100,0%	25,4%	42,9%	4,4%	3,7%	18,0%	5,6%			
2014	100,0%	26,2%	43,3%	4,6%	3,1%	17,3%	5,5%			
2015	100,0%	24,1%	43,1%	4,9%	3,2%	19,2%	5,4%			
2016	100,0%	24,7%	41,9%	5,2%	3,3%	19,6%	5,3%			
2017	100,0%	25,3%	39,7%	6,2%	3,3%	20,1%	5,4%			
2018	100,0%	24,8%	39,8%	6,1%	3,1%	20,9%	5,2%			
2019	100,0%	24,6%	39,7%	5,3%	3,7%	21,4%	5,3%			
2020	100,0%	22,1%	36,4%	4,9%	3,6%	27,7%	5,3%			
2021	100,0%	23,2%	35,3%	4,1%	3,2%	29,2%	4,9%			
2022	100,0%	23,0%	35,1%	5,2%	3,3%	28,0%	5,4%			

Quelle: Statistik Austria, Todesursachenstatistik ; Bearbeitung und Berechnung: Landesstatistik Steiermark.