

Steiermark: Gestorbene nach Todesursachen seit 1970													
	Insgesamt	Todesursachen-Hauptgruppen											
		Bösartige Neubildungen	Krankheiten des Herz-Kreislauf-systems	Krankheiten der Atmungs-organe	Krankheiten der Verdauungs-organe	Sonstige Krankheiten	Verletzungen und Vergiftungen						
in Prozent													
1970	100,0%		17,7%		45,2%		9,9%		5,9%		12,5%		8,8%
1971	100,0%		18,5%		46,9%		6,4%		6,1%		12,3%		9,8%
1972	100,0%		18,7%		49,1%		4,5%		5,8%		11,9%		10,0%
1973	100,0%		19,5%		47,0%		6,4%		6,1%		11,4%		9,5%
1974	100,0%		19,2%		49,2%		5,2%		5,8%		11,1%		9,4%
1975	100,0%		18,4%		48,8%		6,6%		6,2%		11,3%		8,8%
1976	100,0%		18,4%		50,1%		6,3%		6,0%		11,0%		8,2%
1977	100,0%		19,7%		49,6%		4,8%		6,5%		11,0%		8,5%
1978	100,0%		19,0%		50,3%		5,9%		5,9%		10,3%		8,6%
1979	100,0%		19,9%		49,3%		4,9%		6,1%		11,6%		8,2%
1980	100,0%		20,6%		52,4%		4,5%		5,5%		9,0%		8,1%
1981	100,0%		19,6%		52,3%		4,7%		5,8%		9,5%		8,0%
1982	100,0%		20,6%		51,9%		4,2%		5,7%		9,3%		8,3%
1983	100,0%		19,4%		51,7%		5,3%		6,0%		8,6%		8,9%
1984	100,0%		21,5%		51,2%		4,5%		6,2%		8,6%		8,1%
1985	100,0%		20,3%		51,3%		5,4%		5,7%		9,0%		8,2%
1986	100,0%		20,4%		52,3%		4,5%		5,7%		9,2%		7,9%
1987	100,0%		22,0%		51,7%		4,5%		5,4%		8,9%		7,5%
1988	100,0%		22,0%		51,6%		4,3%		5,3%		9,1%		7,8%
1989	100,0%		22,3%		50,8%		4,8%		5,6%		9,2%		7,3%
1990	100,0%		23,0%		49,9%		4,6%		5,4%		9,8%		7,3%
1991	100,0%		22,9%		51,8%		4,5%		5,2%		9,1%		6,5%
1992	100,0%		23,5%		50,9%		4,3%		5,6%		9,2%		6,7%
1993	100,0%		23,9%		51,2%		4,7%		5,7%		8,4%		6,1%
1994	100,0%		24,5%		51,6%		3,7%		5,5%		8,1%		6,6%
1995	100,0%		24,0%		52,4%		4,2%		4,9%		8,1%		6,4%
1996	100,0%		24,2%		53,0%		3,9%		5,1%		7,7%		6,1%
1997	100,0%		24,1%		53,8%		3,8%		4,5%		7,8%		6,0%
1998	100,0%		23,8%		54,3%		4,1%		4,3%		7,6%		5,8%
1999	100,0%		24,2%		54,6%		4,6%		3,8%		7,2%		5,6%
2000	100,0%		25,7%		52,5%		4,3%		4,6%		7,3%		5,6%
2001	100,0%		24,9%		50,9%		4,8%		4,8%		9,4%		5,3%
2002	100,0%		25,6%		47,2%		4,9%		4,7%		11,5%		6,0%
2003	100,0%		25,3%		44,3%		5,9%		5,2%		13,3%		6,0%
2004	100,0%		25,2%		44,7%		5,3%		4,3%		14,9%		5,5%
2005	100,0%		24,8%		43,1%		5,7%		4,6%		15,7%		6,1%
2006	100,0%		25,2%		43,8%		5,4%		4,2%		15,5%		5,9%
2007	100,0%		25,4%		44,3%		5,8%		4,2%		14,7%		5,6%
2008	100,0%		25,5%		43,8%		5,1%		4,0%		15,8%		5,7%
2009	100,0%		24,8%		44,5%		4,6%		4,0%		16,5%		5,5%
2010	100,0%		25,5%		43,9%		5,1%		4,2%		16,3%		5,0%
2011	100,0%		25,7%		42,8%		4,8%		4,2%		17,1%		5,5%
2012	100,0%		25,8%		43,3%		4,6%		3,5%		17,4%		5,3%
2013	100,0%		25,4%		42,9%		4,4%		3,7%		18,0%		5,6%
2014	100,0%		26,2%		43,3%		4,6%		3,1%		17,3%		5,5%
2015	100,0%		24,1%		43,1%		4,9%		3,2%		19,2%		5,4%
2016	100,0%		24,7%		41,9%		5,2%		3,3%		19,6%		5,3%
2017	100,0%		25,3%		39,7%		6,2%		3,3%		20,1%		5,4%
2018	100,0%		24,8%		39,8%		6,1%		3,1%		20,9%		5,2%
2019	100,0%		24,6%		39,7%		5,3%		3,7%		21,4%		5,3%
2020	100,0%		22,1%		36,4%		4,9%		3,6%		27,7%		5,3%
2021	100,0%		23,2%		35,3%		4,1%		3,2%		29,2%		4,9%
2022	100,0%		23,0%		35,1%		5,2%		3,3%		28,0%		5,4%
2023	100,0%		24,2%		35,5%		6,1%		3,9%		24,6%		5,8%
2024	100,0%		24,3%		36,1%		5,2%		3,8%		24,7%		5,9%

Quelle: Statistik Austria, Todesursachenstatistik ; Bearbeitung und Berechnung: Landesstatistik Steiermark.