

Steiermark - Männer: Gestorbene nach Todesursachen seit 1970													
	Insgesamt	Todesursachen-Hauptgruppen											
		Bösartige Neubildungen	Krankheiten des Herz-Kreislauf-systems	Krankheiten der Atmungs-organe	Krankheiten der Verdauungs-organe	Sonstige Krankheiten	Verletzungen und Vergiftungen						
in Prozent													
1970	100,0%		17,7%		41,3%		10,0%		6,7%		12,4%		11,7%
1971	100,0%		18,7%		41,5%		7,1%		7,0%		12,2%		13,4%
1972	100,0%		18,9%		44,5%		5,2%		6,9%		11,8%		12,8%
1973	100,0%		19,9%		42,2%		7,3%		6,9%		11,3%		12,5%
1974	100,0%		19,6%		45,0%		5,6%		6,3%		11,1%		12,4%
1975	100,0%		19,0%		45,0%		6,3%		7,0%		10,9%		11,7%
1976	100,0%		19,0%		46,0%		6,4%		6,8%		10,7%		11,1%
1977	100,0%		20,2%		45,4%		5,5%		7,3%		10,0%		11,6%
1978	100,0%		20,1%		45,6%		5,8%		7,2%		9,7%		11,6%
1979	100,0%		21,4%		44,8%		5,0%		7,1%		10,6%		11,2%
1980	100,0%		21,5%		47,8%		4,9%		6,3%		8,5%		11,0%
1981	100,0%		20,6%		48,0%		4,9%		6,6%		9,0%		10,9%
1982	100,0%		20,9%		47,8%		4,8%		6,6%		8,6%		11,3%
1983	100,0%		20,2%		46,5%		6,4%		6,9%		8,0%		12,0%
1984	100,0%		22,2%		45,8%		5,4%		7,5%		7,8%		11,3%
1985	100,0%		21,4%		46,1%		6,6%		7,2%		8,1%		10,6%
1986	100,0%		21,5%		46,8%		5,6%		7,1%		8,3%		10,7%
1987	100,0%		22,9%		46,0%		5,7%		6,9%		8,3%		10,2%
1988	100,0%		23,6%		46,5%		5,0%		6,6%		7,7%		10,7%
1989	100,0%		24,0%		45,4%		5,8%		6,8%		8,1%		10,0%
1990	100,0%		24,1%		45,1%		5,8%		6,7%		8,4%		9,8%
1991	100,0%		25,1%		44,8%		5,6%		6,4%		8,6%		9,5%
1992	100,0%		25,0%		45,8%		5,3%		6,7%		8,0%		9,3%
1993	100,0%		26,2%		44,9%		5,7%		6,8%		7,6%		8,7%
1994	100,0%		26,1%		46,0%		4,2%		6,6%		7,2%		9,9%
1995	100,0%		25,4%		46,0%		5,6%		6,3%		7,0%		9,7%
1996	100,0%		26,2%		47,2%		4,6%		6,0%		7,0%		9,1%
1997	100,0%		26,1%		48,7%		4,2%		5,6%		6,7%		8,6%
1998	100,0%		26,5%		48,0%		4,9%		5,4%		6,6%		8,7%
1999	100,0%		26,6%		48,5%		5,5%		4,7%		6,4%		8,3%
2000	100,0%		28,0%		46,3%		4,8%		5,8%		7,1%		8,0%
2001	100,0%		27,6%		45,0%		5,2%		5,8%		8,5%		7,9%
2002	100,0%		28,8%		41,2%		5,8%		5,2%		10,2%		8,8%
2003	100,0%		28,2%		37,4%		7,1%		6,1%		12,2%		8,9%
2004	100,0%		28,0%		38,9%		6,4%		5,1%		13,6%		8,0%
2005	100,0%		27,5%		37,0%		6,8%		5,6%		14,4%		8,8%
2006	100,0%		28,2%		37,9%		6,2%		4,7%		14,3%		8,7%
2007	100,0%		28,7%		38,6%		6,7%		4,9%		13,1%		8,1%
2008	100,0%		29,4%		37,8%		5,7%		5,0%		14,0%		8,1%
2009	100,0%		27,8%		38,6%		5,2%		4,6%		16,0%		7,9%
2010	100,0%		28,5%		38,6%		5,7%		5,1%		14,9%		7,2%
2011	100,0%		27,8%		37,9%		5,8%		4,7%		16,3%		7,6%
2012	100,0%		28,9%		37,3%		5,7%		4,3%		16,4%		7,4%
2013	100,0%		28,3%		37,6%		5,2%		4,2%		16,9%		7,7%
2014	100,0%		29,3%		38,3%		5,2%		3,8%		15,8%		7,5%
2015	100,0%		27,2%		37,3%		5,9%		4,1%		17,8%		7,7%
2016	100,0%		27,2%		37,4%		6,1%		4,1%		18,3%		6,9%
2017	100,0%		28,6%		34,4%		6,8%		4,1%		18,4%		7,7%
2018	100,0%		28,2%		35,4%		6,6%		3,4%		18,8%		7,5%
2019	100,0%		27,4%		35,6%		6,2%		4,0%		19,4%		7,3%
2020	100,0%		25,3%		32,9%		5,3%		4,3%		25,2%		7,0%
2021	100,0%		25,3%		31,5%		4,5%		4,0%		28,0%		6,5%
2022	100,0%		24,8%		31,3%		5,4%		4,0%		27,1%		7,4%
2023	100,0%		26,1%		32,6%		6,1%		4,6%		22,9%		7,7%
2024	100,0%		26,4%		33,7%		5,5%		4,5%		22,2%		7,7%

Quelle: Statistik Austria, Todesursachenstatistik ; Bearbeitung und Berechnung: Landesstatistik Steiermark.