

Steiermark - Frauen: Gestorbene nach Todesursachen seit 1970										
	Insgesamt	Todesursachen-Hauptgruppen								
		Bösartige Neubildungen	Krankheiten des Herz-Kreislauf-systems	Krankheiten der Atmungs-organe	Krankheiten der Verdauungs-organe	Sonstige Krankheiten	Verletzungen und Vergiftungen			
in Prozent										
1970	100,0%	17,7%	49,5%	9,7%	4,9%	12,5%	5,7%			
1971	100,0%	18,2%	52,6%	5,7%	5,2%	12,5%	5,8%			
1972	100,0%	18,6%	54,1%	3,8%	4,6%	12,0%	6,9%			
1973	100,0%	19,1%	52,1%	5,4%	5,3%	11,6%	6,5%			
1974	100,0%	18,9%	53,7%	4,7%	5,3%	11,2%	6,1%			
1975	100,0%	17,7%	52,8%	6,9%	5,3%	11,7%	5,6%			
1976	100,0%	17,7%	54,2%	6,3%	5,1%	11,4%	5,3%			
1977	100,0%	19,2%	53,8%	4,0%	5,7%	12,0%	5,4%			
1978	100,0%	17,9%	55,2%	5,9%	4,5%	10,8%	5,6%			
1979	100,0%	18,4%	54,0%	4,8%	5,0%	12,6%	5,2%			
1980	100,0%	19,7%	56,9%	4,1%	4,6%	9,4%	5,2%			
1981	100,0%	18,6%	56,6%	4,4%	5,1%	10,1%	5,1%			
1982	100,0%	20,3%	56,0%	3,5%	4,8%	10,0%	5,4%			
1983	100,0%	18,7%	56,9%	4,2%	5,0%	9,2%	5,9%			
1984	100,0%	20,9%	56,5%	3,5%	4,9%	9,4%	4,9%			
1985	100,0%	19,3%	56,3%	4,2%	4,4%	9,9%	6,0%			
1986	100,0%	19,4%	57,5%	3,4%	4,4%	10,0%	5,2%			
1987	100,0%	21,3%	56,9%	3,4%	4,0%	9,4%	5,0%			
1988	100,0%	20,6%	56,3%	3,6%	4,1%	10,3%	5,1%			
1989	100,0%	20,8%	55,8%	3,9%	4,4%	10,3%	4,8%			
1990	100,0%	22,0%	54,4%	3,5%	4,1%	11,0%	4,9%			
1991	100,0%	20,8%	58,3%	3,5%	4,1%	9,6%	3,6%			
1992	100,0%	22,2%	55,3%	3,3%	4,6%	10,2%	4,4%			
1993	100,0%	21,8%	57,0%	3,7%	4,7%	9,2%	3,6%			
1994	100,0%	22,9%	56,9%	3,3%	4,4%	9,0%	3,5%			
1995	100,0%	22,8%	58,3%	2,8%	3,7%	9,0%	3,4%			
1996	100,0%	22,3%	58,4%	3,3%	4,2%	8,4%	3,3%			
1997	100,0%	22,3%	58,5%	3,4%	3,5%	8,7%	3,6%			
1998	100,0%	21,4%	59,9%	3,4%	3,4%	8,6%	3,2%			
1999	100,0%	22,1%	60,2%	3,7%	2,9%	8,0%	3,1%			
2000	100,0%	23,6%	58,0%	3,9%	3,5%	7,4%	3,5%			
2001	100,0%	22,5%	56,2%	4,5%	3,8%	10,2%	2,9%			
2002	100,0%	22,6%	52,7%	4,1%	4,3%	12,7%	3,6%			
2003	100,0%	22,6%	50,7%	4,8%	4,4%	14,3%	3,2%			
2004	100,0%	22,7%	49,8%	4,4%	3,7%	16,1%	3,3%			
2005	100,0%	22,3%	48,7%	4,8%	3,7%	16,8%	3,6%			
2006	100,0%	22,4%	49,2%	4,7%	3,8%	16,6%	3,3%			
2007	100,0%	22,4%	49,6%	4,9%	3,6%	16,1%	3,4%			
2008	100,0%	21,8%	49,5%	4,6%	3,2%	17,6%	3,4%			
2009	100,0%	22,1%	49,9%	4,1%	3,6%	17,0%	3,3%			
2010	100,0%	22,8%	48,7%	4,6%	3,4%	17,5%	3,1%			
2011	100,0%	23,7%	47,4%	3,8%	3,7%	17,8%	3,7%			
2012	100,0%	23,1%	48,5%	3,7%	2,8%	18,3%	3,5%			
2013	100,0%	22,7%	47,8%	3,7%	3,1%	19,0%	3,7%			
2014	100,0%	23,4%	47,8%	4,1%	2,4%	18,6%	3,7%			
2015	100,0%	21,3%	48,4%	4,0%	2,3%	20,6%	3,4%			
2016	100,0%	22,4%	46,2%	4,3%	2,6%	20,8%	3,8%			
2017	100,0%	22,2%	44,6%	5,8%	2,6%	21,6%	3,2%			
2018	100,0%	21,6%	44,1%	5,6%	2,8%	23,0%	3,0%			
2019	100,0%	22,0%	43,6%	4,4%	3,3%	23,4%	3,4%			
2020	100,0%	19,1%	39,7%	4,5%	3,0%	30,0%	3,7%			
2021	100,0%	21,1%	39,1%	3,6%	2,4%	30,4%	3,4%			
2022	100,0%	21,1%	38,9%	5,0%	2,5%	29,0%	3,5%			
2023	100,0%	22,2%	38,3%	6,1%	3,2%	26,3%	3,9%			
2024	100,0%	22,2%	38,5%	5,0%	3,1%	27,2%	4,1%			
2025	100,0%	22,5%	36,6%	6,7%	3,1%	26,8%	4,2%			

Quelle: Statistik Austria, Todesursachenstatistik ; Bearbeitung und Berechnung: Landesstatistik Steiermark.